

PRESIDENZA NAZIONALE
Via Parigi 11, scala A int. 105 – 00185 Roma

Roma, 26 aprile 2023

**Estratto Circolare Ministeriale prevenzione e controllo dell'influenza:
raccomandazioni per la stagione 2023-2024**

Cari colleghi,
è stata pubblicata la Circolare Ministeriale per la prevenzione ed il controllo dell'influenza stagionale 2023-2024 ed i Pediatri di Famiglia sono ritenuti fondamentali per la riuscita della prossima campagna vaccinale. A questo scopo riteniamo utile riassumere alcuni punti riguardo alla vaccinazione in età pediatrica e adolescenziale.

Chi vaccinare

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta attivamente e gratuitamente (tabella 2 della Circolare):

- Prioritariamente a tutti i bambini e gli adolescenti con patologia cronica dai 6 mesi in poi.
- Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni (come da raccomandazione OMS).
- Bambini e adolescenti con familiari e contatti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
- Indipendentemente dalla tabella 2, i Pediatri dovrebbero applicare il loro giudizio clinico per tenere conto del rischio di influenza che aggrava eventuali malattie di base che un paziente può avere, così come il rischio di gravi malattie derivanti dall'influenza stessa, offrendo in questi casi il vaccino gratuitamente.

Con quale vaccino

- Vaccino Inattivato Quadrivalente sub-unità, split- **VIQ (da 6 mesi di età a 16 anni compiuti)**.
- Vaccino Inattivato Quadrivalente su colture cellulari- **VIQcc (da 2 anni di età a 16 anni)**.
- Vaccino Quadrivalente Vivo Attenuato- **LAIV (da 2 anni di età a 16 anni)**.

Dosi da somministrare

- **2 Dosi**, ripetute a distanza di almeno 4 settimane per bambini di età inferiore ai 9 anni che vengono vaccinati per la prima volta.
- **1 Dose**, bambini di età superiore ai 9 anni e bambini di qualsiasi età già vaccinati negli anni precedenti.

Dove vaccinare

- Studio Professionale del PdF, luogo ideale per la somministrazione del vaccino.
- Ambulatori dell' Azienda Sanitaria dove vaccinano i PdF, secondo Accordi Regionali/Aziendali.

Quando vaccinare

- Prima possibile. Se il vaccino è disponibile, già all'inizio di ottobre, specialmente i bambini che necessitano della seconda dose.
- Offerta vaccinale in qualsiasi momento della stagione influenzale. Questo può essere particolarmente importante se si tratta di una stagione influenzale tardiva o quando si presentano pazienti a rischio non ancora vaccinati.
- Il vaccino può essere co-somministrato con tutti gli altri vaccini. Per il vaccino vivo attenuato attendere 4 settimane dalla somministrazione di un vaccino vivo attenuato, quando i vaccini non sono co-somministrati.

Chi non vaccinare

- Bambini/adolescenti che abbiano manifestato una reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose.
- Bambini/adolescenti con anamnesi positiva per sindrome di Guillain-Barré insorta entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino antinfluenzale.

Altre controindicazioni per il vaccino a Virus Vivo Attenuato (LAIV) sono:

- Immunodeficienza clinica a causa di condizioni o terapie immunosoppressive.
- Asma severo o dispnea attiva.
- Contatti stretti e *caregiver* di persone gravemente immunocompromesse.

Come fare la sorveglianza

- Aderendo al progetto come pediatra sentinella.
- Segnalando eventuali ADR.

Buon lavoro

Cordialità

Martino Barretta
Referente Area vaccinazioni
e immunizzazioni

Antonio D'Avino
Presidente Nazionale